

Síndrome de Sjögren

- ❖ Enfermedad autoinmune crónica caracterizada por infiltración linfocítica de las glándulas salivales y lacrimales.
- ❖ Otras glándulas también pueden comprometerse durante la evolución de la enfermedad (polioxocrinopatía)
- ❖ Se manifiesta por xerostomía y queratoconjuntivitis sicca
- ❖ SS Primario cuando no está asociado a desórdenes del tejido conectivo.
- ❖ SS Secundario, cuando está asociado a AR, Esclerodermia o Lupus eritematoso sistémico
- ❖ Afecta principalmente a mujeres de la 4a y 5a década. Es raro en niños

<http://prevencionlac.wix.com/sjogren>

Varios criterios se han propuesto para el Dx de SS en adultos

Uno de los mas usados es el propuesto por la American-European Consensus Group *:


- I. Síntomas oculares
- II. Síntomas orales
- III. Signos oculares
- IV. Examen histológico de GSMenores
- V. Evidencia objetiva de compromiso glandular
- VI. Evaluación serológica de autoanticuerpos

Vitali C, et al. Clasification criteria for Sjogren' s syndrome: a revised versión of the European criteria proposed by the American- European Consensus group. Ann Rheum Dis 2002;61: 554-8


Criterios diagnósticos para Síndrome de Sjögren

- Queratoconjuntivitis sicca
- Xerostomía
- Infiltración linfocítica de GS menores
- Evidencia de laboratorio de desorden autoinmune sistémico


Sialadenitis linfocítica focal (SS)



S. de Sjögren



Querato Conjuntivitis sicca
Artritis reumatoidea
Factor reumatoideo (+)
Ab contra Ag nuclear Ro (SS-A) y La (SS-B)



S. de Sjögren



- ❖ Marcada xerostomía
- ❖ Atrofia de papilas filiformes
- ❖ Fisuración del dorso lingual. Aspecto de cerebro
- ❖ Candidiasis eritematosa

S de Sjögren



- ❖ Sequedad de la mucosa.
- ❖ Dificultad para deglutir.
- ❖ Dificultad para usar dentaduras completas.
- ❖ Cambios en el gusto.

- ❖ Dificultad para comer alimentos secos.
- ❖ Dificultad para hablar continuo y prolongado.
- ❖ Candidiasis eritematosa.
- ❖ Caries en el cuello de los dientes.






Schirmer:
4mm/5min.


GS: varios focos

- Queratoconjuntivitis sicca
- Glositis atrófica por cándida





- Parotiditis
- Q. C. S. Schirmer < 4mm
- Glositis atrófica
- GS m: Múltiples focos






SS: Dolor y ardor en la lengua debido a marcada sequedad de la boca y atrofia de papilas de la lengua



S. de Sjögren: Glositis atrófica



Mejora notable después
del tratamiento

Control a los 10 días